



FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO
Cartuchos contendo 3, 12, 24 e 60 flaconetes de 10 ml nos sabores pêssego e abacaxi e cartucho contendo frasco de vidro com 150 ml no sabor pêssego.

USO ORAL

USO ADULTO

COMPOSIÇÃO

Cada ml contém
citrato de colina* 50 mg
metionina 10 mg
Veículo q.s.p. 1 ml
(Veículo: sacarina sódica, metilparabeno, propilparabeno, sorbitol, água deionizada, álcool etílico, corante e essência).

*a posologia diária recomendada corresponde a 192% da IDR

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

AÇÃO ESPERADA DO MEDICAMENTO

Enterofigon é um medicamento utilizado como suplemento de aminoácidos, composto por colina, componente necessário para a função normal de todas as células e precursor das lipoproteínas VLDL (responsáveis pela remoção de triglicéridos do fígado) e metionina, um aminoácido essencial, indispensável para formação de proteínas e precursor da glutatona (molécula que combate radicais livres gerados em diversas reações, dentre elas o metabolismo do álcool).

Cuidados de armazenamento: após aberto, manter o medicamento em sua embalagem original. Deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C) e ao abrigo da luz e umidade.

Prazo de validade: 24 meses.

INFORME SEU MÉDICO A OCORRÊNCIA DE GRAVIDEZ NA VIGÊNCIA DO TRATAMENTO OU APÓS O SEU TÉRMINO. INFORMAR AO MÉDICO SE ESTÁ AMAMENTANDO.

SIGA CORRETAMENTE O MODO DE USAR, NÃO DESAPARECENDO OS SINTOMAS PROCURE ORIENTAÇÃO MÉDICA.

REAÇÕES ADVERSAS: **Enterofigon** pode causar náuseas, vômitos, sonolência e desconforto gastrointestinal. Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis.

TUDO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

INGESTÃO CONCOMITANTE COM OUTRAS SUBSTÂNCIAS: Quando administrado junto com levodopa, a metionina pode provocar a diminuição dos efeitos fisiológicos desse medicamento.

CONTRA-INDICAÇÕES E PRECAUÇÕES: **Enterofigon** está contra-indicado em caso de alergia a quaisquer componentes da fórmula, crianças menores que 12 anos, durante a gravidez e lactação. Pacientes com homocistinúria, cirrose e doenças cardiovasculares: conversar com o médico antes de iniciar o uso de **Enterofigon**. Pacientes idosos podem ter sua sensibilidade alterada com a idade. Diabéticos: não contém açúcar. Informe seu médico sobre qualquer medicamento que esteja usando, antes do início, ou durante o tratamento.

NÃO TOME REMÉDIO SEM O CONHECIMENTO DO SEU MÉDICO, PODE SER PERIGOSO PARA A SAÚDE.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

A colina é um componente necessário para a função normal de todas as células. Ela ou seus metabólitos, incluindo fosfolípidios, betaina e acetilcolina, asseguram a integridade estrutural e funções sinalizadoras das membranas celulares. A colina é necessária na síntese de acetilcolina, um

importante transmissor que influencia na função do cérebro, coração, músculo, glândula adrenal, trato gastrointestinal e muitos outros órgãos. Na maioria dos mamíferos, a deficiência da ingestão nutricional de colina depleta seus estoques corporais.

A colina é indispensável para a síntese de fosfolípidios, como a fosfatidilcolina, que compõe parte das lipoproteínas VLDL. A colina pode ser sintetizada endogenamente, mas isso exige uma reação de metilação que envolve metionina. Na falta desses dois aminoácidos, os triglicéridos não podem ser exportados do fígado através das VLDL e se acumulam.

A metionina é um aminoácido essencial, também formada endogenamente através da metilação da homocisteína, é necessária para a síntese de proteínas e fornecimento de grupamentos metila. É precursora da S-adenosilmetionina, molécula doadora de grupamentos metila em praticamente todas as reações biológicas de metilação, dentre elas a formação de fosfatidilcolina. A metionina também é precursora da cisteína, um dos aminoácidos que compõe a glutatona, molécula que combate os radicais livres gerados por diversas reações, entre elas a oxidação de etanol à acetaldéido. Estudo realizado em ratos demonstrou que a administração de metionina normalizou a atividade de algumas enzimas e aumentou os níveis hepáticos de glutatona.

INDICAÇÕES

Enterofigon é um medicamento composto por colina e metionina e é indicado como suplemento de aminoácidos.

CONTRA-INDICAÇÕES

Enterofigon é contra-indicado para pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula, crianças menores que 12 anos, durante a gravidez e lactação.

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

Pacientes com homocistinúria, cirrose e doenças cardiovasculares: conversar com o médico antes de iniciar o uso de **Enterofigon**. Informar ao médico sobre qualquer medicamento que esteja tomando, antes do início ou durante o tratamento.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

A metionina pode diminuir a ação da levodopa.

Apesar de não serem relatadas outras interações medicamentosas, informe seu médico se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

REAÇÕES ADVERSAS

Podem ocorrer reações desagradáveis, tais como: náuseas, vômitos, sonolência e desconforto gastrointestinal. Em caso de aparecimento de reações indesejáveis, seu médico deverá ser informado.

ALTERAÇÕES DOS EXAMES LABORATORIAIS

Não são conhecidas alterações significativas.

POSOLOGIA

Flaconete: 2 flaconetes (totalizando 20 ml), 3 vezes ao dia, antes das refeições. Pode ser diluído em água.

Solução oral: 2 colheres de sobremesa (totalizando 20 ml), 3 vezes ao dia, antes das refeições. Também pode ser diluído em água.

SUPERDOSAGEM

em caso de ingestão acidental de dose muito acima das preconizadas, procurar um médico imediatamente. A ingestão excessiva de colina pode causar hipotensão, com evidência corroborativa de efeitos colaterais colinérgicos (por exemplo: suor e diarreia) e odor corporal piscoso.

PACIENTES IDOSOS

Pacientes idosos podem ter sua sensibilidade alterada com a idade. Recomenda-se o uso sob prescrição médica.

Data de fabricação, data de vencimento e lote
Vide cartucho.

VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA



SAC 0800 7049001
www.kleyhertz.com.br

KLEY HERTZ S.A - Indústria e Comércio
Rua Comendador Azevedo, 224 - P. Alegre - RS
Farmacêutica Resp.: Paula Carniel Antonio
CRF-RS 4228 - Reg. no M.S. nº 1.0689.0014
C. N. P. J. nº 92.695.691/0001-03
INDÚSTRIA BRASILEIRA