



**Flu colic gotas** é apresentado em frasco plástico gotejador com 15 mL.

**Flu colic cápsulas** é apresentado em embalagens com 12 cápsulas gelatinosas.

#### USO ORAL

#### GOTAS – USO PEDIÁTRICO E ADULTO

#### CÁPSULAS – USO ADULTO

#### COMPOSIÇÃO

**Flu colic gotas:** cada mL (30 gotas) contém 75 mg de simeticona e os seguintes ingredientes inativos: propilenoglicol, carmelose sódica, metilparabeno, sacarina sódica, propilparabeno, aroma de morango e água deionizada.

**Flu colic cápsulas:** cada cápsula contém 125 mg de simeticona e os seguintes ingredientes inativos: dióxido de titânio, metilparabeno, propilparabeno, corante amarelo 10, corante azul brilhante, gelatina e água deionizada.

#### INFORMAÇÕES AO PACIENTE

#### AÇÃO DO MEDICAMENTO OU COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

**Flu colic** atua no estômago e no intestino, rompendo bolhas de gases ou dificultando a sua formação. Estas bolhas retêm os gases, provocando flatulência e dor. Com a atuação de **Flu colic**, os gases tornam-se livres, sendo mais facilmente eliminados, diminuindo o desconforto causado por eles.

#### INDICAÇÕES DO MEDICAMENTO OU PORQUE ESSE MEDICAMENTO FOI INDICADO?

**Flu colic** é indicado para pessoas com excesso de gases no aparelho digestivo. Este acúmulo de gases no estômago e no intestino é chamado de flatulência, tendo como sintomas principais a sensação de incômodo, estufamento, dor ou cólicas no abdômen. A eliminação dos gases pelo **Flu colic** alivia estes sintomas. **Flu colic** também pode ser usado como medicação auxiliar em exames médicos, como endoscopia digestiva, e preparo de pacientes para radiografia do abdômen.

#### RISCOS DO MEDICAMENTO OU QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

#### Contraindicações

Você não deve utilizar **Flu colic** se for alérgico ou sensível a qualquer um dos componentes da fórmula.

#### INFORME AO MÉDICO OU CIRURGIÃO-DENTISTA O APERECIMENTO DE REAÇÕES INDESEJÁVEIS.

**Advertências:** não existem advertências ou recomendações especiais para a utilização de **Flu colic**, uma vez que este produto demonstra ser bem tolerado.

**Precauções:** não existem precauções ou cuidados especiais para a utilização de **Flu colic**, uma vez que este produto demonstra ser bem tolerado.

**Uso em idosos e crianças:** não há recomendações especiais para utilização de **Flu colic** por pacientes idosos e crianças.

**Interações medicamentosas:** não são conhecidas interações de **Flu colic** com outros medicamentos ou alimentos.

**Informe seu médico se você estiver fazendo uso de algum outro medicamento.**

#### MODO DE USO OU COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

#### Aspecto físico e características organolépticas

**Flu colic gotas** é uma emulsão de cor branca, com sabor e cheiro de morango.

**Flu colic cápsulas gelatinosas** são moles, de formato oval, cor verde, e contém um líquido branco no seu interior, sem cheiro nem gosto. É normal a presença de um conteúdo de aparência opaca, no interior das cápsulas gelatinosas.

**Como usar:** ao utilizar **Flu colic cápsulas gelatinosas**, você deve engolir a cápsula sem mastigá-la. As cápsulas gelatinosas são moles e fáceis de engolir.

Ao utilizar **Flu colic gotas**, você pode administrar as gotas diretamente na boca, ou diluir em um pouco de água ou outro alimento. **Agite o frasco de Flu colic gotas antes de usar.**

#### Como utilizar o frasco conta-gotas

- 1) Abrir a tampa, rompendo o lacre.
- 2) Incliná-lo levemente o frasco (inclinação de 45°) e iniciar o gotejamento.

#### Posologia

#### Gotas (30 gotas/mL):

**Crianças - lactentes:** 4 a 6 gotas, 3 vezes ao dia.

**Até 12 anos:** 6 a 12 gotas, 3 vezes ao dia.

**Acima de 12 anos e adultos:** 16 gotas, 3 vezes ao dia.

#### Cápsulas gelatinosas:

4 vezes ao dia, após as refeições e ao deitar, ou quando achar necessário. Você não deve ingerir mais de 4 cápsulas (500mg) de **Flu colic** por dia.

**Siga corretamente o modo de uso. Se não desaparecerem os sintomas, procure orientação médica.**

**Não utilize o medicamento com o prazo de validade vencido. Antes de usar este medicamento, observe o seu aspecto.**

**As cápsulas gelatinosas não podem ser partidas ou mastigadas.**

#### REAÇÕES ADVERSAS OU QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE CAUSAR?

A simeticona (princípio ativo do produto) não é absorvida pelo organismo, atuando somente dentro do aparelho digestivo, sem alcançar a corrente sanguínea. Desta forma, é totalmente eliminada pelas fezes, sem maiores chances de causar reações indesejáveis no organismo.

**Você deve informar ao seu médico o aparecimento de reações indesejáveis, ou seja, efeitos diferentes do esperado para este medicamento.**

#### CONDUTA EM CASO DE SUPERDOSE OU O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA GRANDE QUANTIDADE DESTA MEDICAMENTO DE UMA SÓ VEZ?

Não é esperado o aparecimento de sintomas causados pelo uso exagerado de simeticona, pois este medicamento não é absorvido pelo organismo. Caso você utilize **Flu colic** em uma quantidade maior do que a recomendada, procure um médico imediatamente.

#### CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO OU ONDE E COMO DEVO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

**Flu colic** deve ser conservado à temperatura ambiente (entre 15 e 30°C), protegido da luz, umidade e calor excessivo.

**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**

**Data de fabricação, validade e lote: vide cartucho.**

#### INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE

#### CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS

**Farmacologia:** **Flu colic** possui como componente ativo a simeticona, um silicônio com ação antitumultuante, que alivia o mal-estar gástrico causado pelo excesso de gases.

**Farmacocinética:** A simeticona não é absorvida para a corrente sanguínea, apresentando somente ação local. Desta forma, a realização de estudos farmacocinéticos a seu respeito torna-se inviável.

**Mecanismo de ação:** A simeticona é capaz de reduzir a tensão superficial das bolhas de ar presentes no trato gastrointestinal, permitindo que as mesmas se desfaçam ou que formem uma grande massa de ar, facilmente expelida por meio de eructações ou flatos.

#### RESULTADOS DE EFICÁCIA

**Utilização de simeticona na prevenção do desconforto abdominal pós-operatório:** Foi demonstrada significativa redução das reclamações por náusea, vômitos, meteorismo, desconforto no estômago e dores abdominais, bem como de movimentos peristálticos e flatulência, em pacientes com distensão causada por gases durante o período pós-operatório de seção cesariana. Com base nos resultados obtidos, na não-toxicidade da simeticona, sua característica de inércia química, boa tolerabilidade e fácil utilização, a simeticona é considerada muito útil na terapia de prevenção do desconforto causado pelos gases no pós-operatório após seção cesariana.

**Simeticona para melhoria da visibilidade durante colonoscopia:** Estudos demonstraram que a administração de simeticona juntamente com a preparação oral de fosfato de sódio, utilizada na colonoscopia, pode melhorar a visibilidade do cólon, por diminuição da presença de bolhas. Esta melhoria na qualidade da visualização do cólon facilita a detecção de lesões patológicas.

**INDICAÇÕES:** **Flu colic** é indicado em casos de excesso de gases no aparelho gastrointestinal, tais como: meteorismo, eructação, borboríngos, aerofagia, pós-operatório e convalescença, bem como distúrbios fermentativos intestinais. É indicado também no preparo de pacientes para radiografia do abdômen, colonoscopia e gastroscopia, por sua ação redutora das bolhas de ar.

**CONTRAINDICAÇÕES:** Alergia ou sensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula.

#### MODO DE USAR:

**Flu colic cápsulas gelatinosas:** engolir a cápsula sem masti-

gá-la. As cápsulas gelatinosas são moles e fáceis de engolir. **Flu colic gotas:** administrar as gotas diretamente na boca, ou diluir em um pouco de água ou outro alimento. **Agite o frasco de Flu colic gotas antes de usar.**

#### Como utilizar o frasco conta-gotas:

- 3) Abrir a tampa, rompendo o lacre.
- 4) Incliná-lo levemente o frasco (inclinação de 45°) e iniciar o gotejamento.

#### POSOLOGIA:

**Gotas (30 gotas/mL):**

**Crianças - lactentes:** 4 a 6 gotas, 3 vezes ao dia.

**Até 12 anos:** 6 a 12 gotas, 3 vezes ao dia.

**Acima de 12 anos e adultos:** 16 gotas, 3 vezes ao dia.

**Cápsulas gelatinosas:**

4 vezes ao dia, após as refeições e ao deitar, ou quando achar necessário. Você não deve ingerir mais de 4 cápsulas (500mg) de **Flu colic** por dia.

**ADVERTÊNCIAS:** Não há advertências ou recomendações especiais sobre o uso de **Flu colic**.

**USO EM IDOSOS E CRIANÇAS:** Não há recomendações especiais para utilização de **Flu colic** por pacientes idosos e crianças.

**INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:** Não são conhecidas interações de **Flu colic** com outros medicamentos ou alimentos.

**REAÇÕES ADVERSAS:** A simeticona (princípio ativo do produto) não é absorvida pelo organismo, atuando somente dentro do aparelho digestivo, sem alcançar a corrente sanguínea. Desta forma, é totalmente eliminada pelas fezes, sem maiores chances de causar reações indesejáveis no organismo. **Você deve informar ao seu médico o aparecimento de reações indesejáveis, ou seja, efeitos diferentes do esperado para este medicamento.**

**SUPERDOSE:** Não é esperado o aparecimento de sintomas causados pelo uso exagerado de simeticona, pois este medicamento não é absorvido pelo organismo. Caso você utilize **Flu colic** em uma quantidade maior do que a recomendada, procure um médico imediatamente.

**ARMAZENAGEM:** **Flu colic** deve ser conservado à temperatura ambiente (entre 15 e 30°C), protegido da luz, umidade e calor excessivo.

**Data de fabricação, validade e lote: vide cartucho.**

**VENDA SEM PRESCRIÇÃO MÉDICA.**



**SAC 0800 7049001**  
[www.kleyhertz.com.br](http://www.kleyhertz.com.br)

**KLEY HERTZ S/A – Indústria e Comércio**  
Rua Comendador Azevedo, 224 – Porto Alegre – RS  
Farmacêutica responsável: Paula Carniel Antonio  
CRF/RS-4228 – Reg. no M.S.: 1.0689.0132  
C.N.P.J. nº 92.695.691/0001-03 – Indústria Brasileira

**Flu colic cápsulas gelatinosas**  
Fabricado por: Relthy Laboratórios Ltda.  
Rua Av. José Vieira, 446 – Distr. Ind. Domingos Gomes  
Indaiatuba – SP – C.N.P.J nº 58.884.735/0001-05  
Para: **KLEY HERTZ S/A – Indústria e Comércio**